

ONMIDDELLIJKE EXTIRPATIE DER PULPA ZONDER BLOEDING.

W. L. Reed to Mexico Minnesota schrijft hierover het volgende.

Begin langzaam, een beter en sneller resultaat is te verwachten van geringen druk en weinig pijn dan wanneer direkt sterke druk wordt uitgeoefend, hetgeen trouwens ook meer pijn veroorzaakt.

Cocaïne en Eucain in elk bekenden vorm en oplossing is aan proefneming onderworpen geweest; het beste is gebleken te zijn cocaïne en glycerine in verzadigde oplossing. Ten eerste blijft deze oplossing een onbepaalde tijd onveranderlijk, ten tweede kan men van deze oplossing elke gewenschte verbinding maken. Bovendien schijnt deze oplossing in gevallen van werkelijke blootligging der pulpa osmotische eigenschappen te bezitten zooals geen ander.

In vele gevallen blijkt er een affiniteit van de blootliggende pulpa voor glycerine te bestaan en wordt anaesthesie der pulpa verkregen, bijna zonder druk uit te oefenen.

Het is vermoedelijk de ervaring van een ieder, dat, zoo de pulpa eenmaal met arsenicum is behandeld, dit later moeilijkheden oplevert.

Reed gaat als volgt te werk. In een pas blootgelegde pulpa wordt de caviteit eerst met lauw water uitgespoten; daarna wordt de cofferdam aangelegd om op betere resultaten te kunnen rekenen. Verwijderd nu zoo mogelijk al het verwekte dentin zonder de geringste pijn op te wekken. Breng een watje bevochtigd met cocaïne-glycerine op de pulpa en vul de caviteit op met zwarte ongevulcaniseerde caoutchouc. Met een kogelvormig instrument wordt lichte druk op de caoutchoucprop uitgeoefend en verzoekt den patient een teeken te geven zoodra ook maar de geringste pijn wordt gevoeld.

Zware druk is bij het begin niet noodig, dit staat de anaesthesie maar in den weg. Wordt geen pijn meer waargenomen, leg dan de pulpa voorzichtig over de geheele oppervlakte vrij en zorg er voor dat het pulpaweefsel gesneden noch beschadigd wordt. Blijft pijn bestaan of terugkeeren, begin dan opnieuw. Is het cavum dentis geheel open en de pulpa pijnloos, vul dan de caviteit geheel op met de zwarte caoutchouc alleen, zonder watje. Oefen hierop, voor eenige oogenblikken, sterken druk uit en tracht de caoutchouc in het wortelkanaal te persen, waardoor de pulpa vaak geheel bloedloos en droog wordt gedrukt en als een bijna witte vezel aan de pulpanaald zit.

Niet altijd gelukt dit doch wel in de meeste gevallen, door oefening wordt het succes steeds grooter.

Heb geen te groote haast wanneer anaesthesie is verkregen en oefen den druk een weinig langer uit, want loopt de operatie zonder bloeding af dan wordt veel tijd uitgewonnen.

In die gevallen waar nog een klein overblijfsel van de pulpa in de distale wortel blijft steken en uiterst gevoelig blijft, pompe men een weinig van de coc. glyc. oplossing in dat wortelkanaal. Volkomen anaesthesie treedt spoedig in.

Western. Dental Journal.

PERSONALIA.

Bevorderd tot Tandmeester de Heeren L. G. TH. BAATEN
en J. MINK SCHOL.
