

## Vragenbus en Varia,

onder leiding van B. R. BAKKER.

---

Tengevolge van een val zijn bij een patient stukken der praemolaren en molaren afgebroken wat groote gevoeligheid veroorzaakt. De toestand is zoo dat vullingen of kronen me niet aangewezen lijkt. De etsingen met Ag. NO<sup>3</sup> geven geen voldoende resultaat. Weet iemand, behalve de „tijd” een vlugger middel?

WILLEMSE.

Na de Ag No<sub>3</sub> oplossing nog imprigneeren met benzoehars oplossing, is althans iets dat soms helpt. (Benzoehars oplossen in alcohol, filtreren, dan filtraat verdunnen met chloroform).

Wie weet iets anders, misschien beters?

B. R. B.

Fischer raadt aan om injectiespuiten, enz. te bewaren in een glazen flacon met standaard, gevuld met absolute alcohol. Daar alcohol hygroscopisch is, legt hij een linnen zakje, met uitgegloeid kopersulphaat, op den bodem van het vat. Ik heb echter opgemerkt, dat de gewone naalden in alcohol na een paar dagen roesten en ook dat er spoedig bezinsel in de flesch komt, waardoor een en ander een onzindelijk aanzien krijgt. Daarna heb ik zeepspectrum geprobeerd, doch ben daarvan teruggekomen, omdat de instrumenten daardoor erg glad worden en zoo licht aan onze handen ontglippen. Het is me twee keer gebeurd dat mijn

spruit viel en daardoor de cylinder brak. Thans gebruik ik de volgende oplossing: 5 % Lysol, 5 % Carbol, 1% soda. De naalden blijven in die oplossing goed en ook het nikkel wordt niet in het minst aangetast. Voor het gebruik spoel ik de geheele spruit onder de kraan af, droog ze en spruit daarna eenige malen door met gedistilleerd water om alle sporen van het antisepticum te verwijderen. De spruit vaak losschroeven en in al zijn onderdeelen reinigen blijft natuurlijk noodzakelijk.

TH. C. BOELAARS.

Wat verstaat men onder „Wetenschappelijke opstelling van een kunstgebit”.

Maakt men bij afdrukken voor porcelein-inlay gebruik van Matrix-ease ('n zeer aan te bevelen camphorpreparaat van S. S. White) dan lette men er op geen stukje van het omhullende stanniol mee in den goudvorm te brengen, verbranden der matrix is het onvermijdelijk gevolg.

Gebruik geen goud in verbinding met Weston-metaal.

Tanninum tot stroopdikte opgelost in enkele druppels alcohol is een voortreffelijk middel tegen nabloeding.

Eén of meerdere tampons, naar den vorm der tandkas ermee bevochtigd, worden stevig in den uitgedroogden tandkas gedrukt en vastgehouden. De tampons kunnen gewoonlijk in dezelfde zitting worden uitgenomen.

Anticalcine brengt men gemakkelijk in den door pyorrh. alveolaris aangetasten tandkas, door middel van een platina pulpa-extractor. De haakjes der naald zijn stevig genoeg om tevens te dienen voor verwijdering der verweekte serumkalk. Naald natuurlijk inbrengen met naar den wortel gekeerde weerhaakjes.

Bl.

M.