

VARIA.

Het komt dikwijls voor, dat we een volle of gedeeltelijke onderprothese moeten vervaardigen voor een patiënt die sedert langen tijd een volle bovenprothese heeft gedragen.

In den regel worden de onderkunstmolaren dan opgesteld in occlusie met die van de gedragen boven-prothese, terwijl overigens de anatomisch-physiologische verhoudingen verwaarloosd worden.

Deze methode moet verworpen worden, omdat het tot stand brengen van een occlusie *zonder meer* geen functie zonder stoornissen waarborgt.

't Gevolg is abnormale druk op het tandvleesch; na korter of langer tijd zal de tot stand gebrachte occlusie verloren zijn gegaan. De ongewenschte pijnlijke druk veroorzaakt vaak een ondragelijken last en een vroegtijdige absorbtie der betreffende kaakdeelen, zoodat de patiënt niet zelden de onder-prothese als onpraktisch ter zijde legt. Dat 't een onbegonnen werk is door afslijpen of afvijlen den stand der occlusievlakken te verbeteren, behoeft wel geen nader betoog.

BERNARD FRANK.

Hulp voor een Belgisch Collega.

François Cotils, tandarts uit Antwerpen, thans verblijf houdende in het Christelijk Tehuis voor Zeelieden, Veerhaven 15 Rotterdam, doet een beroep op de Hollandsche Collega's om hem in de gelegenheid te stellen in het onderhoud van zich en de zijnen te voorzien door een plaats als assistent. Hij is ook bereid technische werkzaamheden op zich te nemen.
