

## Hoe te devitaliseeren.

---

In zijn artikel, onder dezen titel verschenen in het Tijdschrift van Oct. j.l. geeft coll. M. J. H o m a n eene opsomming van vele, door diverse auteurs aangegeven methoden, om te komen tot het verwijderen van eene levende pulpa. De schrijver bespreekt ook vrij uitvoerig de druk-anaesthesie-methode, en houdt zich dus niet strikt aan den door hem gekozen titel, — wat zijn recht is.

Mij geeft dat echter aanleiding tot de aanvullende opmerking, dat ook anaesthesie door middel van submuceuse injectie in sommige gevallen aan te bevelen is en goede resultaten geeft. Ik denk hier aan gevallen, waar door een trauma fronttanden gefractureerd zijn, zoodat de levende pulpa geëxponeerd is, en afsluiting van een devitalisatiemiddel bezwaren meebrengt. Of wanneer men fronttanden met levende, maar niet geëxponeerde pulpa, wenscht te decapiteeren en om een of andere reden niet den tijd heeft, om vooraf te devitaliseeren. In dergelijke gevallen is het mij herhaaldelijk uitstekend gelukt, in ééne zitting de pulpa-exstirpatie, eventueel gepaard met decapitatie, pijnloos te verrichten, zonder dat nadien bezwaren optraden.

In het hoofdstuk „Die Indikationsfrage der Lokalanästhesie” pag. 80 vlg. van zijn boek „Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde”, 3e dr., spreekt F i s c h e r ook hierover. De belangstellende lezer zij dus daarnaar verwezen.

J. S. Ez.

---