

EEN ZELDZAME FOLLICULAIRE CYSTE

door Dr. J. R. JANSMA.

Onlangs verscheen op mijn spreekuur een 67 jarige mannelijke patient naar aanleiding van een onder de bovenlip gelegen balvormige tumor. Twee jaar geleden had patient een dergelijk gezwel gehad, dat zeer langzaam in omvang was toegenomen, nooit pijn had gedaan, alleen hinderlijk was voor het dragen van zijn partiëel bovengebitt. Bij de incisie was er toen veel „etter” uitgekomen. In den laatsten tijd kwam de tumor weer opzetten en vooral de laatste vier weken hinderde zij den patient zeer. Pijnlijkheid was ook nu afwezig. De neusademhaling was ongestoord.

In de bovenkaak waren behalve eenige molaarresten slechts beiderzijds een praemolaar aanwezig. Aan de labiale zijde van den processus alveolaris der bovenkaak was in de mediaanlijn een balvormige, noot-groote tumor gezeteld, met glanzend, normaal gekleurd slijmvlies overdekt. (Zie figuur). Duidelijke fluctuatie was aanwezig. Bij incisie spoot bruingele vloeistof uit de tumor, gevolgd door een flinke bloeding. Bij betasting met de sonde bleek de bijna eigroote holte overal een gladde wand te bezitten; geen tand werd gevoeld. Op de Röntgenphoto (Dr. C. G. Beukers) zag men rechts een geïmpacteerd element.

De cyste werd nu aan de voorzijde onder lokaal anaesthesie ruim geopend, waarbij rechts de kroon van een caninus in het zicht kwam. Dit 2,8 c.m. lange element werd nu zeer voorzichtig geextraheerd, de voorwand der cyste verwijderd en de holte met jodoformgaas getamponneerd. De caninus was flink ontwikkeld, vertoonde alleen aan den top email defecten.

Het zeldzame in dit geval is vooral gelegen in den hoogen ouderdom van den patient. Folliculaire cysten komen toch meestal in de jeugd voor, na het twintigste jaar zijn ze zeldzaam en gaan dan gewoonlijk uit van een verstandskies.

Hilversum, Juli 1921.