

REMINERALISEEREND TANDPOEDER EN DE Z.G. PYORRHEA ALVEOLARIS

DOOR
G. LIND.

Antwoord aan Collega Michaëlis.

Indien andere collegae, evenals Michaëlis, — uit de in 't kort weergegeven ziektegeschiedenis van pat. Mevr. V. in mijn artikel: Hoe en waarmee moeten wij onze tanden reinigen?, — tot dezelfde conclusie mochten zijn gekomen, n.l., dat ik z.g. pyorrhoea alv. bij mijne patienten behandel event. kan genezen uitsluitend door hun remineraliseerend tandpoeder te laten gebruiken, — ja, dan hebben de opmerkingen van Michaëlis zeer zeker hun recht van bestaan.

Wanneer men echter bovengenoemd artikel in haar geheel doorleest, zal men vinden, dat ik alleen den adstringeerenden tevens stimuleerenden invloed van het vrijkomende koolzuur, op de weeke bestanddeelen, genoemd heb, als een der gunstige nevenwerkingen van dit poeder.

Zeer terecht merkte Michaëlis daarom ook later op, dat de grootste waarde van dit poeder, — afgescheiden van haar invloed op de harde tandbestanddeelen, — is als prophylacticum tegen slijmvliesandoeningen event. tegen z. g. alv. pyorrh., en als zoodanig bijzonder aanbeveling verdient.

Waar wij echter bij de behandelingen van gingivitis, of van de verschillende marginale parodontosen, — om de

nomenclatuur van Weski te gebruiken, — ook als adjuvans, naast onze andere meer of minder chirurgische behandelingsmethoden, middelen met dergelijke adstringerende en stimulerende eigenschappen, noodig hebben, meen ik met recht te kunnen zeggen, dat het remineraliseerend tandpoeder is gebleken een waardevol middel te zijn bij de behandelingen van gingivitis en pyorrh. alv.

In dit verband wil ik tevens gaarne toevoegen, dat patienten met neiging tot tandsteenvorming, deze zeer aanzienlijk zal zien verminderen, door het geregeld gebruik van dit door mij beschreven poeder, — hetgeen een ook niet onbelangrijk prophylactische factor is tegen marginale parodontosen van exogenen aard.

Dat ik in bovengenoemde ziektegeschiedenis korthedshalve de uitdrukking: pyorrhea alveolaris gebruikt heb, is zeer zeker te critiseeren, en ben ik het inderdaad volkomen met Michaëlis eens, dat wij beter doen deze oude benaming te laten varen, en een meer exacte nomenclatuur te gebruiken, waarbij duidelijker uitkomt welk ziekteproces er zich inderdaad afspeelt in het de tanden omliggende weefsel.

Volledigheidshalve deel ik daarom mede, dat ik op 4 Mei 1921 bij Mevr. V. naast de andere genoemde afwijkingen: bij 3 van de 4 ondersnijtanden Pyorrhea supra-alveolaris verticalis constateerde, en is het m. i. vanzelfsprekend, dat bij een dergelijke afwijking, waar dus een gedeelte van den alveolairrand verdwenen is, nooit door welk poeder ook een restitutio ad integrum plaats kan vinden.

Maar wel is het een feit, dat de gezondheidstoestand van de slijmvliezen bij mijne „pyorrhea-patienten” veel vlugger normaal wordt, wanneer ze, naast de door mij toegepaste specifieke behandeling, geregeld hun tandvleesch en tanden met remineraliseerend tandpoeder borstelen.
