

HET GEBRUIK VAN MATRICES

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de mededelingen van collega H. Brouwer in het decembernummer 1956 zou ik gaarne het volgende willen opmerken.

Het heeft mijn verwondering gewekt, dat hij de z.g. Walser matrix aanbeveelt als hulpmiddel bij het aanbrengen van een disto-palatinale of -linguale amalgaamvulling in een hoektand, daar dit nu juist de enige matrix is die ik niet zou nemen. Een matrixband behoort in bucco-palatinale richting uitgenomen te worden, terwijl de Walser-matrices met behulp van een tang in axiale richting worden verwijderd met kans op beschadiging van de vulling.

De door collega Brouwer verguisde Meba-spanner kan zeer wel worden toegepast, wanneer de band cervicaal met een houten wigje wordt gefixeerd. Een stevig ingedreven wigje sluit de caviteit cervicaal perfect af en maakt het mogelijk de amalgaamvulling krachtig te condenseren. Door het bandmateriaal te bruneren kan het contactpunt uitstekend worden hersteld. Ook de door collega J. van Amerongen aangegeven ringetjes van bandmateriaal, die in diverse maten zijn te verkrijgen, zijn op deze plaats in combinatie met houten wigjes met veel succes toe te passen. Tenslotte kan men matrixband nog bevestigen door deze te voorzien van twee gaatjes en daardoor een ligatuur strak aan te trekken.

Alle boven aangegeven methoden laten horizontale verwijdering van de matrixband toe en voorkomen beschadiging van de vulling. Zij zijn bovendien goedkoper.

J. M. Ruyten, Venray