

UIT DE PRAKTIJK

HYPERAEMIE VAN DE TANDPULPA DOOR DE INWERKING VAN BEPAALDE TANDPASTA'S OP HET GEZONDE TANDOPPERVLAK ?

DOOR K. H. F. KOOPMAN

In de praktijk van alledag trof het mij, hoe vaak het voorkomt, dat patiënten, wier gebit in goede toestand verkeert, klagen over gevoeligheden, die niet uit de uitwendige toestand der elementen vallen te verklaren.

Deze gevoeligheden concentreren zich soms op één kaakhelft, grotendeels echter zijn alle elementen overgevoelig; koude lucht, die langs de elementen strijkt, en zoet zijn dikwijls aanleiding tot een zó hevige pijn, dat patiënten met gave gebitten zelfs komen met het voorstel om tot totale extractie over te gaan.

Deze abnormale reactie op normale prikkels, die na korte tijd verdwijnt, leidt tot de vermoedelijke diagnose: hyperaemie van verschillende pulpae.

Daar hier in 't algemeen niet van nerveuze of verzwakte personen sprake is en de aandoening in gelijke mate bij manlijke en vrouwelijke patiënten voorkomt, kunnen inwendige oorzaken waarschijnlijk wel uitgeschakeld worden en moet aan chronische irritatie van buitenaf worden gedacht.

Bij navraag bleek mij nu dat alle patiënten met bovenomschreven klachten tandpasta gebruikten van hetzelfde fabrikaat; bovendien verdwenen deze klachten nadat zij op een ander reinigingsmiddel waren overgegaan.

Hoewel een exact bewijs hiermee geenszins geleverd is, ligt toch het vermoeden voor de hand, dat irritatie van de uitlopers der tandpulpa wordt veroorzaakt door zekere bestanddelen in een bepaald fabrikaat tandpasta, met hyperaemie der pulpa als gevolg. Dit betekent een nieuw ziekteverschijnsel in de tandheelkundige praktijk, dat — als de oorzaak bekend is — gemakkelijk en snel kan worden verholpen.