

AANVULLING

Ter aanvulling van het artikel „Functionele anatomie van het kauwen” door G. Becht, T. v. T. 64; 229 (1957) drukken wij de volgende tabellen af:

TABEL 1

	Temporalis		Masseter		Pterygoïdeus		Totaal t. + m. + p.
	post.	ant.	med.	lat.	int.	ext.	
Zebu	65		15	275	237		592
Wisent	78		440		216		734
Paard	256		1325		614	109	2304
Tijger	135	335	130	310	72		982
Beer	520		140	105	45		810
Hond	61		11	10	3	6	91
Stekelvarken . .	3,5		4,2				
Marmot ¹⁾	4		4,2 ²⁾	12	1,7	1,8	27,4
			6,5				
			1,5 ³⁾	6	2,2	1,1	21,3

¹⁾ Naar gegevens van Starck en Wehrli (1935).

²⁾ M. maxillo-mandibularis.

³⁾ M. zygomatico-mandibularis.

Gewichten van kauwspieren in grammen; (gemiddelden van links en rechts).

TABEL 2

	Temporalis	Masseter	Pterygoïdeus
Graseters { zebu	11	50	40
{ wisent	10,5	60	30
{ paard	11	57,5	31,5
	11	56	34
Vleeseters { tijger	48	45	7
{ beer	64	30	5,5
{ beer ¹⁾	66	28	6
{ hond	67	23	10
	61	31,5	7
Knaagdieren { stekelvarken .	13	74	13
{ marmot ²⁾ . . .	19	66	15
	16	70	14

¹⁾ Naar gegevens van Frick (1951).

²⁾ Naar gegevens van Starck en Wehrli (1935).

Gewichten van kauwspieren uitgedrukt in procenten van het totaal. Daarnaast de gemiddelden vet gedrukt.

Deze tabellen horen bij de tekst op blz. 236 onder C.