

## NOGMAALS: ALLERGISCHE REACTIES OP KUNSTHARSEN

Naar aanleiding van het co-referaat van Prof. BUISMAN in het decembern timer 1960 betreffende „Allergische reacties op kunstharsen” het volgende:

In april 1958 kwam een patiënt op mijn spreekuur met een sterk branderig gevoel in de hele mond. Hij droeg een volle prothese boven en een Wild Kl. III onder-prothese.

Inspectie van de mond wees niets uit, geen roodheid, geen drukplaatsen enz. Het palatum, evenals de rest van de mucosa, was bleekrose. De prothese was  $\pm$  10 jaar oud en het branderige gevoel was sinds enkele weken opgetreden.

Bij controle van de beet bleek deze 8 mm te hoog te zijn en dus een andere prothese of een overzetting geïndiceerd. Tot dit laatste werd besloten.

Begin mei werd de nieuwe boven-prothese geplaatst. Voor het gevoel van de patiënt zat de prothese prettig en had hij in het begin geen last meer. Na een maand kwam het hinderlijke gevoel terug. Volgens de patiënt kon hij de prothese niet inhouden, zowel onder als boven niet. Na 10 min. „brandde de prothese zijn mond uit”.

Met het tussenleggen van tinfoolie bleek de patiënt niet geholpen.

In november heb ik de patiënt verwezen naar de specialist. Deze schreef terug dat hij bij de patiënt niets kon constateren. De prothese zat goed en dat het grootste deel van de klachten vermoedelijk terug te voeren zou zijn op te weinig doorzettingsvermogen en nervositeit. Indien de patiënt de moed kon opbrengen de prothese regelmatig te dragen en er zouden inderdaad waarneembare overgevoeligheids-verschijnselen aan de mucosa optreden, dan kon overwogen worden de prothese in een ander soort kunsthars te maken of een vitallium-plaat aan te brengen.

Na die tijd heb ik de patiënt niet meer teruggezien tot maart 1960, waarbij hij mij kwam vertellen, dat het branderige gevoel weg was.

Het volgende was gebeurd. In februari kreeg de patiënt een hardnekkige griep, zo zelfs, dat de huisarts geconsulteerd werd. Uit de anamnese vermoedde deze echter nog iets anders en verwees hem derhalve naar een internist, die een tamelijk zware diabetes constateerde. Zodra deze gereguleerd werd, was de patiënt het branderig gevoel kwijt.

De vraag zou nu echter nog gesteld kunnen worden, of dit gevoel weer terug kwam, indien de patiënt enkele dagen geen insuline meer kreeg, doch zover ben ik niet gegaan.

H. STRAUS

Akerstraat 41, Heerlen