

EEN LASTIG GEVAL (III)**'Gaarne extractie van 35 en 45 in linguoversie'**

Niet zelden worden patiënten naar een kaakchirurg verwezen met het verzoek linguaal doorgebroken tweede premolaren in de onderkaak te verwijderen. Het moeilijk kunnen reinigen van deze gebitselementen en de kans op caviteiten in de buurelementen worden als redenen tot dit verzoek opgegeven.

Toch moet met het verwijderen van dit soort elementen terughoudendheid wor-

den betracht, zeker in die gevallen waar reeds een enigszins diepe beet bestaat. Maar al te vaak blijkt het extractiediaasteem zich namelijk niet te sluiten door de verwachte migratie van de molaren mesiaalwaarts, maar door het distaal migreren van het onderfront, waardoor een diepe palatumbeet ontstaat. Deze palatumbeet kan, indien hierdoor parodontale problemen ontstaan, uitsluitend worden gecorrigeerd

door een chirurgisch-orthodontische behandeling. Het consulteren van een orthodontist of het voorkomen van distaalwaartse migratie van het onderfront door het plaatsen van een prothetische voorziening, kan een diepe beet met parodontale problemen en daarmee een lastig geval voorkomen.

D. B. Tuinzing, kaakchirurg



Afb. 1. Alvorens tot verwijdering van premolaren in linguoversie wordt besloten, dienen de mogelijke gevolgen van een diepe beet overwogen te worden.