

# Multiple choice vragen over 'open-mondhouding'

Wilt u uw huidige kennis over 'open-mondhouding' toetsen, dan kan dat aan de hand van de onderstaande vragen. Hebt u de bovenstaande bijdrage over dit onderwerp al bestudeerd, dan zal het beantwoorden van de vragen u niet moeilijk vallen. Indien dat toch blijkt tegen te vallen, kan dit u wellicht tot herlezen aansporen. Natuurlijk kunt u er ook de goede antwoorden, vermeld op blz. 76, op naslaan.

**1. De functionele activiteit die van het grootste belang wordt geacht voor de ontwikkeling van het gebit en de groei van de kaken, is:**

- a. kauwen
- b. spreken
- c. slikken
- d. ademen

**2. Het onbewust achteroverhouden van het hoofd door een plaatselijke luchtwegobstructie treedt op:**

- a. vrijwel nooit
- b. vrijwel onmiddellijk
- c. na een aantal dagen
- d. na een aantal jaren

**3. Kinderen met adenoïdhypertrofie vertonen gemiddeld:**

- a. meer naar voren gekipte ondersnijtanden en naar achteren gekipte bovensnijtanden
- b. meer naar voren gekipte bovensnijtanden en naar achteren gekipte ondersnijtanden
- c. meer naar voren gekipte onder- en bovensnijtanden
- d. meer naar achteren gekipte onder- en bovensnijtanden

**4. Een verticale groeirichting van het gelaat kan klinisch worden vastgesteld doordat de kaakhoek:**

- a. geen antegonial notching vertoont
- b. groter is dan  $30^\circ$
- c. groter is dan  $90^\circ$
- d. groter is dan  $130^\circ$

**5. Open-mondhouding gaat vaak samen met een:**

- a. verhoogde en naar achteren geplaatste tong
- b. verhoogde en naar voren geplaatste tong
- c. verlaagde en naar achteren geplaatste tong
- d. verlaagde en naar voren geplaatste tong

**6. In het algemeen wordt aanbevolen om open-mondhouding tegen te gaan vanaf de leeftijd van:**

- a. zes maanden
- b. zes jaar
- c. acht jaar
- d. tien jaar

**7. Aanbevolen wordt om mondpleisters als volgt uit te voeren:**

- a. dicht en stug
- b. dicht en elastisch
- c. open en stug
- d. open en elastisch

**8. Het sluiten van een open beet met vaste orthodontische apparatuur gaat zelden gepaard met:**

- a. het ontstaan van wortelresorpties
- b. het ontstaan van een open beet elders in het gebit
- c. een stabiele correctie van een open beet
- d. een afwijkende tongpositie

**9. Een snelle sutuurexpansie leidt meestal tot:**

- a. verbetering van de neuspassage
- b. verslechtering van de neuspassage
- c. een onveranderde neuspassage
- d. stabiele correctie van een open beet

**10. Het chirurgisch omhoogverplaatsen van de bovenkaak leidt meestal tot:**

- a. verbetering van de neuspassage
- b. verslechtering van de neuspassage
- c. een onveranderde neuspassage
- d. stabiele correctie van een open beet.